

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 23-3-72 291927

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D. D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS  
C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

25 Frs

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 138 DE MARS 1972 - TOUS DEPARTEMENTS..... p. 13

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POMMIER - Dans les départements de Maine et Loire, de la Loire Atlantique, sauf le Nord, et de la Vendée, des projections d'ascospores, déjà abondantes, sont susceptibles de se produire au cours des prochaines pluies. Les variétés à débourrement précoce ont déjà atteint le stade sensible C3 D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux), les variétés à débourrement plus tardif sont sur le point d'atteindre ce stade sensible.

En conséquence, sur toutes les variétés ayant atteint le stade C3 D, il y a lieu d'effectuer un traitement immédiat. Sur les variétés à débourrement plus tardif, les arboriculteurs devront intervenir au fur et à mesure que ce stade sera atteint. Sur les variétés à débourrement très tardif, il est inutile de traiter pour le moment.

Dans les vergers des départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Nord de la Loire Atlantique, il est inutile de traiter pour l'instant, sauf sur les variétés à débourrement très précoce qui ont atteint le stade C3 D.

TAVELURE DU POIRIER - Dans les départements de la Sarthe, de la Mayenne et dans le Nord de la Loire Atlantique, des projections d'ascospores déjà abondantes sont possibles au cours des prochaines pluies. Par conséquent, sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 D, il y a lieu d'effectuer un traitement dès réception de cette note. Sur les variétés à débourrement très tardif, un premier traitement devra être exécuté au fur et à mesure que le stade C3 D sera atteint.

Dans les vergers de la Vallée de la Loire et de la Vendée, le traitement conseillé dans le bulletin du 25 mars dernier doit être terminé de toute urgence.

OIDIUM DU POMMIER - Les premières conidies sont formées et des contaminations sont par conséquent susceptibles de se produire. Sur les variétés sensibles, on pourra profiter du traitement dirigé contre la tavelure pour assurer la protection contre cette affection, en ajoutant à la bouillie un fongicide anti-oidium.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Des indications précises sur les interventions à exécuter contre ce parasite en fonction des projections d'ascospores, seront communiquées cette année dans ces bulletins.

Dans l'immédiat, il n'y a pas lieu d'intervenir contre cette maladie, les périthèces n'étant pas mûrs.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription Phytosanitaire des  
"Pays de Loire"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements  
Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 17 MARS 1972